

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 8 del 19.06.2024

Fase fenologica prevalente: **Accrescimento acini**

## PERONOSPORA

Trattare

L'attuale fase fenologica di rapidissima crescita delle dimensioni degli acini rappresenta un momento di forte sensibilità all'ingresso del fungo all'interno delle bacche stesse. Si consiglia quindi di proseguire nella difesa utilizzando prodotti antiperonosporici a base

### **Metalaxil-M + Rame**

con l'eventuale aggiunta di **Fosetil Alluminio**

**utilizzare le dosi a ettaro e trattare entro fine settimana.**

## OIDIO

Trattare

A causa della particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico sistemico (I.B.E.).

È possibile, in alternativa intervenire con Zolfo in Polvere.

## MUFFA GRIGIA

Trattare

**LOTTA INDIRETTA:** Si consiglia di favorire l'arieggiamento dei grappoli con una razionale sfogliatura evitando di eccedere per limitare le possibili scottature dovute all'esposizione diretta al sole.

**LOTTA DIRETTA:** per le varietà sensibili che abbiano già raggiunto la fase fenologica di pre-chiusura del grappolo, si consiglia di effettuare un trattamento specifico a base di **Fludioxonil + Ciprodinil**, opp. **Pirimetanil**, opp. **Fenexamide**, opp. **Fenpyrazamine**. *Affinché il prodotto possa svolgere appieno la propria azione occorre effettuare una preventiva razionale sfogliatura della fascia dei grappoli e distribuire l'intera dose per ettaro indicata in etichetta sulla fascia grappoli.*

**VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI**

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617