

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 5 del 22.05.2024

Fase fenologica prevalente: **Grappoli separati – Bottoni fiorali separati**

BIOLOGICO

PERONOSPORA

Trattare

Le condizioni meteorologiche permangono incerte e nemmeno nei prossimi giorni è previsto che si stabilizzino verso il bello.

In una tale situazione, l'unica possibile strategia è quella di mantenere costante la copertura della vegetazione prevenendo le nuove infezioni e agendo sulle eventuali macchie d'olio che si presenteranno bloccando la formazione dei conidi in corrispondenza delle macchie sulla pagina inferiore delle foglie. Si ribadisce quindi il consiglio di sfruttare ogni "finestra" di tempo sereno e di transitabilità dei terreni per intervenire con prodotti a base di **RAME** ogni qual volta le piogge intense lo dilavino e comunque ad intervalli non superiori ai 7 giorni.

Si ricorda che anche per questa campagna non potranno essere impiegati più di 4 kg di rame metallo per ettaro e per anno. È quindi necessario preferire formulati commerciali con basse concentrazioni di rame e bassi dosaggi.

OIDIO

Trattare

A causa della particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Zolfo Bagnabile**

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617