

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 4 del 13.05.2024

Fase fenologica prevalente: **Grappoli separati – Bottoni fiorali separati**

PERONOSPORA

Trattare

Le frequenti piogge, le temperature assestatesi sopra i 10°C, le infezioni peronosporiche ormai certamente in atto (anche se al momento non sono stati segnalati sintomi della malattia) e le previsioni meteorologiche tutt'altro che confortanti, impongono interventi frequenti ed efficaci.

In una situazione così complessa si consiglia di sfruttare ogni “finestra” di tempo sereno e di transitabilità dei terreni per intervenire con prodotti a base di:

Dimetomorf oppure **Mandipropamid + Folpet**
con l'eventuale aggiunta di **Fosetil Alluminio**

ESCORIOSI

Trattare

Sempre più diffuse sono le manifestazioni ascrivibili alla malattia. Il trattamento consigliato contro la Peronospora svolge un'azione di controllo anche su questo patogeno (occorre in ogni modo specificare che se non mutano le condizioni climatiche, poco si potrà fare per controllarne la diffusione).

OIDIO

Trattare

A causa della particolare sensibilità della vite in questa fase fenologica, si raccomanda di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di **Meptyl-dinocap** (2° dei due trattamenti ammessi con questa sostanza attiva).

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617