

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 4 del 13.05.2025

Fase fenologica prevalente: **Grappoli separati**

PERONOSPORA

Trattare

Le condizioni climatiche rimangono incerte e in alcuni vigneti sono state osservate le prime manifestazioni della malattia. Essendo indispensabile mantenere una copertura efficace e durevole di vegetazione e grappoli, si consiglia di intervenire entro metà settimana con la miscela antiperonosporica a base di

Metalaxil-M + Folpet

Si ricorda che i trattamenti di inizio stagione, soprattutto in annate piovose che seguono annate in cui la malattia è stata ovunque diffusa e aggressiva, sono essenziali per poter garantire nel prosieguo dell'annata la sanità dei grappoli.

Si ricorda, a coloro che detenessero ancora scorte di Dimetomorf, che l'impiego di questa molecola è ammesso solo fino al 20/05/2025

OIDIO

Trattare

La difesa della vite dal mal bianco è efficace solo se si agisce con strategie preventive. Già nella fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli, in formazione. Si consiglia pertanto di miscelare all'antiperonosporico un antioidico a base di **Spiroxamina** opp. **Cyflufenamid**. È possibile in alternativa impiegare **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617