

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013  
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO  
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 25.06.2022

Fase fenologica prevalente: Pre-Chiusura grappolo

## FLAVESCENZA DORATA

Trattare

In ottemperanza al decreto di lotta obbligatoria relativo al controllo del vettore della Flavescenza dorata, l'attuale fase di sviluppo dell'insetto viene ritenuta idonea all'effettuazione del primo intervento obbligatorio, utilizzando il formulato commerciale **EPIK SL** a base del principio attivo **ACETAMIPRID**. Si consiglia di intervenire in un periodo che va **dal 25 giugno al 4 luglio utilizzando la dose di 1,5 litri per ettaro.**

La scelta di utilizzare Epik SL è supportata dall'esigenza di poter disporre, nei periodi prossimi alla vendemmia, di un secondo formulato a base di Acetamiprid con tempo di carenza più breve.

*Trattandosi di un principio attivo efficace e registrato su vite anche contro Popillia japonica, la scelta di questo prodotto rappresenta la corretta strategia di controllo dell'insetto in questa specifica fase.*

**Rispettare le prescrizioni del PAN**

(per approfondimenti vedere D.LGS 150 del 14/08/2012)

## PERONOSPORA E OIDIO

Trattare

### PERONOSPORA

Si consiglia di aggiungere alla miscela insetticida un prodotto a base di

**Zoxamide + Rame**

Ove non avesse piovuto utilizzare esclusivamente prodotti rameici.

### OIDIO

Aggiungere alla miscela un prodotto specifico a base di **Metrafenone**, oppure **Ciflufenamid**, oppure **Proquinazid** opp. **Fluxapyroxad**

**VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI**

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800  
Confagricoltura Alessandria 0142 452209  
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617